



LAGUNA BLANCA GRANDE, PARTIDO DE OLAVARRÍA

CAMPAÑA DE RELEVAMIENTOS LIMNOLOGICOS E ICTIOLOGICOS

INFORME TECNICO N° 198

Páginas totales: 18

Fecha de estudio: Marzo de 2021
Fecha de publicación: Abril de 2021



**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PESCA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO**



ELABORACION DE INFORME

Lic. Gustavo E. Berasain

Lic. Claudia A. Marcela Velasco

TAREAS DE CAMPO

Lic. Gustavo E. Berasain

Téc. Segundo Cadario

ANÁLISIS DEL ZOOPLANCTON

Prof. Damián Padín

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PESCA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO**



INTRODUCCIÓN

El presente Informe tiene por objeto presentar los resultados de la Campaña Técnica realizada durante los días 23 y 24 de marzo de 2021 en la laguna Blanca Grande, Partido de Olavarría y compararlos con los estudios realizados por esta repartición en la misma laguna y con la información de otros cuerpos de aguas de la provincia de Buenos Aires.

Durante el desarrollo de la Campaña, se llevaron a cabo tareas de muestreo limnológico e ictiológico, en el cuerpo de agua en cuestión. Los mismos estuvieron especialmente dirigidos a la evaluación del estado poblacional del pejerrey (*Odontesthes bonariensis*) dado que en dicha laguna se desarrolla una pesquería deportiva de esta especie.

OBJETIVOS GENERALES

1. Determinar la composición de la comunidad íctica lagunar sobre la base de sus abundancias relativas en las capturas.
2. Determinar el estado poblacional del Pejerrey sobre la base de estimaciones de índices de uso corriente, dirigidos especialmente a los siguientes ítems:
 - Estructuras de tallas de la población.
 - Estado actual e histórico de los ejemplares mediante la implementación de índices de condición y su situación con respecto a los valores estándar para la especie.
 - Disponibilidad alimentaria. Análisis cuantitativos de las poblaciones zooplanctónicas.
3. Evaluar el estado general del agua de la laguna a partir de análisis físico-químico de muestras de agua y la medición de parámetros físicos in situ.
4. Sobre la base de la totalidad de los resultados elaborar un diagnóstico y sugerir estrategias de explotación y manejo tendientes a conservar la calidad y cantidad del recurso íctico.



METODOLOGÍA.

Determinación de las estaciones de muestreo:

Se establecieron estaciones de muestreo en sitios diferentes de la laguna con el fin de obtener información representativa de los ambientes costeros y de aguas abiertas. En cada una se realizaron las siguientes tareas:

- Medición de parámetros limnológicos y toma de muestras de agua para su posterior análisis físico-químico.
- Muestreo de la comunidad planctónica, toma de muestras de Zooplancton.
- Muestreo de peces con tren de redes de enmalle y trampas, (ver Apartado Muestreos Ictiológicos).

MUESTREOS ICTIOLÓGICOS.

A. Descripción de los artes de pesca y Operatoria.

A.1. Trenes de redes de enmalle

Se utilizaron redes de enmalle dispuestas en un tren de paños de distinto tamaño de malla. El tren de redes utilizado estuvo compuesto por redes de multifilamento de 14 mm- 19 mm- 21 mm - 25 mm - 28 mm - 32 mm - 36 mm y 40 mm. bar (de nudo a nudo vecino). Cada una de las citadas tiene longitudes variables entre 4,5 a 70 metros de relinga y una altura de 1,3 m (tabla 1). El tendido fue realizado en forma paralela a la dirección del viento.

El tendido del tren de enmalles tuvo una duración aproximada de 14 horas, realizándose el calado a las 18 horas y retirándose a las 8 horas del día siguiente.

Tabla 1: Tamaño de las redes de diferente malla que componen cada tren.

Malla mm.	14	19	21	25	28	32	36	40
Largo m	4.5	7.4	8.6	13.4	20.2	30.2	45.4	70.2



A.2. Trampas para peces

Se utilizó una Trampa tipo “garlito” , cuyas características fueron descritas por Colautti (1998). Cada trampa es un tubo de red de 9 m de largo que se mantiene abierto con una luz interna rectangular gracias a la tensión generada por el anclaje en el sentido del eje mayor del arte y cuatro (4) marcos (1,2 x 0.80 m) dispuestos de manera equidistante. Los peces ingresan por la boca de la trampa que tiene forma cónica, guiados por dos alas laterales de dos metros de largo y una central de 25 m. Las medidas se proporcionan a continuación en la tabla 2.

Tabla 2: Dimensiones y forma de la trampa

Largo total (eje longitudinal)	31 m
Ancho total (eje transversal)	4.5m
Marcos	1,2 x 0,80 m
Perímetro del tubo	4m
Largo tubo	9 m
Ala central	25 m
Alas laterales	2 m C/u

La trampa fue colocada desde la tarde hasta la mañana del siguiente día, en una estación de muestreo cerca de la costa. La posición fue con su eje principal perpendicular a la orilla y su boca orientada hacia la costa.

B. Procesamiento de las capturas.

B.1. Los ejemplares obtenidos con las trampas y los trenes de redes de enmalle fueron clasificados por especie registrándose el número de individuos y peso total de cada una.

B.2. Los ejemplares capturados por el tren de enmalle fueron separados en recipientes individuales debidamente identificados con el número de malla correspondiente a cada una de las redes.

B.3. Medición de la Longitud Estándar de los pejerreyes (medida tomada desde el extremo anterior de la boca del pez hasta la articulación de los radios de la aleta caudal) con precisión de un centímetro, mediante el uso de un ictiómetro. Ello permitió agrupar a los individuos de pejerrey en intervalos de Longitud Estándar de 10 mm de amplitud.



B.4. Con respecto a los ejemplares de Pejerrey provenientes de cada red, los mismos fueron procesados separando una submuestra de cada grupo de talla establecido, constituida por un número máximo de 10 ejemplares mediante su elección al azar.

B.5. Los ejemplares integrantes de cada submuestra fueron sometidos a las siguientes mediciones y determinaciones: Longitud Estándar con precisión de 1 mm. Peso con precisión de un gramo. Determinación de sexo.

C. Calculo de Índices.

C.1. Captura por Unidad de Esfuerzo

Con la finalidad de obtener una primera aproximación a la abundancia relativa de las especies de peces de la laguna con respecto a otros cuerpos de agua estudiados, se procedió a calcular la Captura por Unidad de Esfuerzo de trampas (CPUEt) y por enmalles en cantidad (CPUE_n) y en peso (CPUE_w) para la especie pejerrey, medidas en ind./u.e. y en kg./u.e., con el objeto de obtener la biomasa capturada para dicho cuerpo de agua. Este valor se refiere al número promedio de ejemplares capturados con una determinada unidad de esfuerzo de pesca.

En nuestro caso la Unidad de Esfuerzo fue definida como el promedio de las capturas de cada arte empleado, trampas y de redes de enmalle, para un tiempo de tendido de 12 horas de duración. Las mismas han sido utilizadas en numerosos estudios realizados en otros cuerpos de agua de la Provincia de Buenos Aires, por lo que permiten realizar una comparación entre los valores de CPUE.

C.2. Estructura de tallas e Índice Estructural.

Cuando se analizan las distribuciones de talla de captura realizadas con un tren de redes agalleras es necesario remarcar que cada uno de los paños que lo compone presenta una talla óptima de captura, siendo progresivamente menos eficientes para retener los peces conforme la talla de los mismos se hace mayor o menor que ese óptimo. Esta característica de captura que exhiben las redes agalleras, denominada selectividad, establece que una red en particular sea capaz de capturar un rango de tallas determinado, de acuerdo con su



tamaño de malla. Como consecuencia de lo explicado, la distribución de tallas de captura no representa la distribución real de la población a no ser que los datos se corrijan por la selectividad particular de cada red. En el caso particular de nuestro tren de redes hemos desarrollado las fórmulas necesarias para corregir la selectividad de las redes 19, 21, 25, 28, 32 y 36, pudiendo obtener de este modo una distribución de tallas estimada, cercana a la real de la población.

Con el fin de evaluar la calidad del recurso pesquero pejerrey, se calculó la densidad proporcional de peces de calidad comercial (**PSD**) utilizando los datos de capturas totales del tren sin corregir (Anderson, 1976), según la fórmula:

$$PSD = \frac{n^{\circ} \text{ de peces } \geq 245\text{mm}}{n^{\circ} \text{ de peces } \geq 120\text{mm}} \times 100$$

Para comparar la condición física de los pejerreyes que habitan la laguna estudiada con respecto a los estándares de la especie, se calculó el peso relativo W_r según la fórmula:

$$W_r = \frac{W}{W_s} \times 100$$

Donde W , es el peso observado de los individuos en la laguna estudiada. W_s es el peso estandarizado para un individuo de la misma talla, calculado conforme a la fórmula $W_s = -5,267 + 3,163 \log_{10}$ obtenida a partir de 20155 pares de datos de pejerreyes de diversos cuerpos de agua. Los valores cercanos a 100 indican que los peces se encuentran en óptimas condiciones, alrededor de 85 una condición regular y menores a 75 mala.

RESULTADOS.

I. PLANCTON.

Zooplankton.

De los grupos zooplanctónicos, los Cladóceros y los Copépodos (tanto Calanoideos como Ciclopoideos) resultan de principal importancia en lo que concierne a la alimentación natural del pejerrey, forman parte de su dieta básica y predilecta. En general, las variaciones estacionales del plancton muestran una curva bimodal, con mínimos estival e



invernal, y máximos en otoño y primavera, aunque no hay estricta coincidencia en los diversos cuerpos de agua.

En la tabla 3 se expone la densidad de los diferentes grupos del zooplancton medidos en abundancia de individuos por cada litro de agua.

El análisis cuantitativo reveló una comunidad poco abundante en términos de abundancia de organismos pertenecientes a los diferentes grupos. Los rotíferos y nauplios (larvas de copépodos), grupos de tamaño pequeño, constituyen un alimento de baja calidad para el pejerrey y normalmente componen una parte importante de la comunidad zooplanctónica. En este estudio sus proporciones resultaron escasas y pueden ser consideradas muy inferiores a los valores normales para el promedio de las lagunas bonaerenses. En cuanto al zooplancton de mayor tamaño, los cladóceros y los copépodos ciclopoideos estuvieron en valores cercanos a la media de las lagunas bonaerenses. En cambio los copépodos Calanoideos estuvieron muy por debajo del valor promedio entre todas las lagunas estudiadas. Los copépodos harpacticoideos estuvieron ausentes (figura 1). Estos resultados, donde se destaca cierta abundancia de las tallas mayores para Cladóceros y copépodos Ciclopoideos, promueven un valor alto de alimento para la laguna, resaltando una alta calidad del recurso alimentario disponible para dicha laguna (tabla 3).



Tabla 3: Análisis cuali-cuantitativos de los distintos grupos Zooplanctónicos, correspondientes al estudio realizado en la laguna de Blanca Grande.

Grupos	Promedio lagunas pampeanas	Blanca Grande
	Nº ind/litro	Nº ind/litro
Rotíferos	1126,55	173,33
Nauplius	306,79	27,30
Cladoceritos	4,82	
Cladóceros	114,63	93,17
Copepoditos	33,41	
Copépodos Harpacticoideos	2,76	
Copépodos Ciclopoideos	31,43	32,07
Copépodos Calanoideos	25,36	0,87
Otros	0,91	
Total	1646,65	326,73




Figura 1: Abundancia de los principales grupos zooplanctónicos pertenecientes a la laguna Blanca Grande. Comparación entre los valores correspondientes al promedio obtenido entre las diferentes muestras realizadas en otras lagunas pampeanas.



II. MUESTREOS ICTIOLÓGICOS.

A 1. Capturas con artes de Enmalle.

En la tabla 4 se presentan los datos de las diferentes especies capturadas con el tren de redes de enmalle en la laguna Blanca Grande. De la misma se desprende que las capturas estuvieron representadas por cinco especies y dominadas en un alto porcentaje por el pejerrey (96,7 %), seguido en segundo lugar por el dientudo (2,09 %), el porteño, el sabalito y la carpa (figura 2).

Tabla 4: Diferentes especies capturadas con el tren de redes agalleras y número de ejemplares capturados de cada una, corregidas a 25 m. y 12 hs. de pesca.

Especie	R14	R19	R21	R25	R29	R32	R36	R40	Total
<i>Parapimelodus valenciennesi</i> (Porteño)						0,76	2,03		2,80
<i>Cyphocharax voga</i> (Sabalito)					1,14	0,76			1,91
<i>Oligosarcus jenynsii</i> (Dientudo)		9,36							9,36
<i>Odontesthes bonariensis</i> (Pejerrey)	256,41	37,42	69,77	34,44	20,56	9,17	3,56	0,99	432,32
<i>Cyprinus carpio</i> (Carpa)							0,51		0,51
total	256,41	46,78	69,77	34,44	21,71	10,70	6,10	0,99	446,89

En la tabla 5 se presentan los datos de la biomasa capturada de cada especie con el tren de redes de enmalle en la laguna Blanca Grande. De la misma se desprende que el mayor porcentaje fue de pejerrey (95,86 %), seguido por la carpa (1,52 %), el porteño, el sabalito y el dientudo (figura 3).

Tabla 5: Biomasa capturada con el tren de redes corregidas a 25 m. y 12 hs. de pesca.

Especie	R14	R19	R21	R25	R29	R32	R36	R40	Total
Porteño						93,22	368,52		461,7
Sabalito					86,82	180,34			267,2
Dientudo		283,78							283,8
Pejerrey	7261,54	3168,40	7827,37	7560,28	5404,80	2941,93	2070,32	931,62	37166,2
Carpa							590,65		590,6
total	7261,5	3452,2	7827,4	7560,3	5491,6	3215,5	3029,5	931,6	38769,6




Figura 2: Abundancia en número de individuos de las especies capturas en la laguna Blanca Grande.




Figura 3: Abundancia en biomasa de las especies capturas en la laguna Blanca Grande.

A.2. Capturas con trampa.

A continuación se presentan las capturas realizadas con trampas en la laguna Blanca Grande, donde se puede observar que se capturaron ejemplares de seis especies.

Tabla 6. Abundancia de las diferentes especies capturas con la trampa en la laguna Blanca Grande.

especie	N° ind	peso
<i>Pimelodella laticeps</i> (Bagarito cantor)	1	6
<i>Corydoras paleatus</i> (Tachuela)	1	1
<i>Odontesthes bonariensis</i> (Pejerrey)	20	187
mojarra colita colorada	2	4
<i>Bryconamericus iheringi</i> (Mojarra)	7	14
<i>Cheirodon interruptus</i> (Mojarra)	14	22
total	45	234

La especie mejor representada en abundancia de individuos fue el pejerrey (44,44 %), seguido por la mojarra colita negra (31,1 %), la mojarra plateada (15,56 %) y el resto de las especies (figura 4). Si tenemos en cuenta la biomasa capturada con este arte de pesca, la especie con mayor biomasa en el muestreo fue el pejerrey (79,91 %), seguida por la mojarra colita negra (9,40 %), la mojarra plateada (3,58 %) y el resto de las especies (figura 5).




Figura 4: Abundancia relativa promedio de las especies capturas en la laguna Blanca Grande.




Figura 5: Abundancia relativa promedio de la biomasa de las especies capturas en la laguna Blanca Grande.

La población de pejerrey

Las capturas totales de pejerrey efectuadas en la laguna Blanca Grande, con el tren de agalleras, distribuidas cada intervalo de talla de 10 mm por medida de red, se representa en la figura 6 y dichas capturas con la corrección a 12 horas y 25 metros para cada medida de red en la figura 7. En estas gráficas se evidencia, que la población está integrada básicamente por una buena cantidad de individuos comprendidos entre 115 y 315 mm. La presencia de individuos mayores a esta longitud estándar fue escasa. En otras palabras, el cuerpo de agua posee una gran cantidad de juveniles de pejerrey y una buena cantidad de pejerreyes medianos y grandes.




Figura 6: Distribución de las capturas totales ordenadas cada intervalos de 10mm de longitud estándar (Lst.) para cada uno de los trenes.




Figura 7.: Distribución de tallas de capturas totales del tren y transformada a una longitud de 25 m para todos los paños para la laguna Blanca Grande.

El índice PSD, que expresa la abundancia relativa de pejerreyes de talla con interés deportivo y comercial ($> 245\text{mm}$ Lst) arrojó un valor de 13,38. Este valor puede considerarse bajo. La CPUE (N° ind) arrojó valores bajos (432,32) al igual que la CPUEw (37,96 kg). Estos índices demuestran que si bien la calidad pesquera del cuerpo de agua es buena, hay un claro predominio de las tallas menores que el próximo año se incorporarán al grupo que se puede pescar deportivamente (mayores a 25 cm de longitud total).

Peso relativo W_r

Los pejerreyes de la laguna Blanca Grande presentaron una condición óptima para los pejerreyes de menor tamaño, con una tendencia a desmejorar a medida que se incrementa el tamaño de los peces (fig. 8).




Figura 8: Peso relativo promedio (W_r) obtenido en función de la longitud estándar (Lst.) de los pejerreyes capturados en la laguna Blanca Grande.

Relación longitud peso

La relación existente entre el peso y el largo de los pejerreyes se ajustó de manera muy estrecha al modelo potencial convencional y los valores observados no mostraron

desvíos demasiado grandes con respecto a la curva de ajuste (Fig 9). En la tabla 4 se detallan los parámetros de la curva que mejor se relacionó con las variables mencionadas para la laguna Blanca Grande.




Figura 9: Relación entre la longitud y el peso de los pejerreyes capturados en la laguna Blanca Grande, en círculos valores observados, en línea modelo ajustado.

Tabla 4: Estadísticos de la relación longitud peso para la laguna estudiada.

Regresión Lst-W	
pendiente	3,03
intersección	-4,97
r2	0,99
Lst max	452
Lst min	116

ANÁLISIS FÍSCO-QUÍMICOS:

La muestra de agua dio un valor de salinidad de 1 g/L y la transparencia del agua fue menor a 15 cm.



CONCLUSIONES

1. El recurso alimentario del pejerrey (plancton lagunar) resultó ser de buena calidad y abundancia, arrojando valores similares de abundancia relativa para los diferentes grupos de importancia como los de mayor tamaño (Cladóceros y copépodos ciclopoideos). Estos datos explicarían la falta de pique de los últimos meses,
2. Sobre la base de estos resultados se puede concluir que el pejerrey resulta ser la especie dominante en la laguna estudiada.
3. En la laguna Blanca Grande la población de pejerrey está bien estructurada, con una abundancia de las tallas menores pero con presencia de todas las tallas y edades teniendo en cuenta el rango de tamaños capturados. Esta condición de la población de pejerrey es muy similar a la registrada en el año 1993 (Freyre y Sendra, 1993).
4. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE^o) asumió un valor de 432,3, con una gran mejoría en relación a estudios anteriores, como el del año 2003 el cual fue de 12,7. Lo mismo ocurrió con el valor de la (CPUE_w), el cual fue de 37,96, muy superior al del año 2003 que fue de solamente 1,34. En comparación con otros cuerpos de agua de la Provincia, los valores de estos índices indican una buena población de pejerrey.
5. Los pesos relativos (Wr) estimados para la laguna indican que los individuos de la población de pejerrey en general presentan un estado físico óptimo, con una tendencia a desmejorar a medida que se incrementa el tamaño de los peces.



Bibliografía:

Freyre, LR y ED Sendra. 1993. Relevamiento Pesquero de la Laguna Blanca Grande (Partido de Olavarria, Pcia. de Buenos Aires). AQUATEC N° 1, 1993.

Colautti D y M. Remes Lenicov. 2003. Laguna Blanca Grande, partido de Olavarría. Campaña de relevamientos limnológicos e ictiológicos. Informe técnico n° 54. Ministerio de Asuntos Agrarios.

**DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICULTURA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO**