



**LAGUNA JUANCHO
PARTIDOS DE DAIREAUX Y BOLIVAR**

CAMPAÑA DE RELEVAMIENTOS LIMNOLOGICOS E ICTIOLOGICOS

INFORME TECNICO N° 91

Páginas totales: 17

Fecha de estudio: **Septiembre 2006**
Fecha de publicación: **Diciembre 2006**

Departamento de Desarrollo y Tecnología Pesquera

DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO

**SUBSECRETARIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS Y
DESARROLLO DEL DELTA
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS**

TAREAS DE CAMPO

Lic. Federico Argemi

Profesor Fernando Mir

Téc. Martín Rodríguez

ELABORACION DE INFORME

Lic. Gustavo E. Berasain

Lic. Federico Argemi

DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO

INTRODUCCION

El presente Informe tiene por objeto presentar los resultados de la Campaña Técnica realizada durante los días 17 y 18 de Septiembre de 2006 en la laguna Juancho, partidos de Daireaux y Bolívar y compararlos con los estudios realizados por esta repartición en la misma laguna y con la información de otros cuerpos de aguas de la provincia de Buenos Aires.

Durante el desarrollo de la Campaña, se llevaron a cabo tareas de muestreo limnológico e ictiológico, en los cuerpos de agua en cuestión. Los mismos estuvieron especialmente dirigidos a la evaluación del estado poblacional del pejerrey (*Odontesthes bonariensis*).

OBJETIVOS GENERALES

1. Determinar la composición de la comunidad íctica lagunar sobre la base de sus abundancias relativas en las capturas.

2. Determinar el estado poblacional del Pejerrey sobre la base de estimaciones de índices de uso corriente, dirigidos especialmente a los siguientes ítems:

- Estructuras de tallas de la población.
- Estado actual e histórico de los ejemplares mediante la implementación de índices de condición y su situación con respecto a los valores estándar para la especie.
- Disponibilidad alimentaria. Análisis cuali-cuantitativos de las poblaciones zooplanctónicas.

3. Sobre la base de la totalidad de los resultados elaborar un diagnóstico y sugerir estrategias de explotación y manejo tendientes a conservar la calidad y cantidad del recurso íctico.

METODOLOGIA.

Determinación de las estaciones de muestreo:

Se establecieron estaciones de muestreo en sitios diferentes de las lagunas con el fin de obtener información representativa de los ambientes costeros y de aguas abiertas. En cada una se realizaron las siguientes tareas:

- Medición de parámetros limnológicos y toma de muestras de agua para sus posteriores análisis físicos y químicos.
- Muestreo de la comunidad planctónica, toma de muestras de Zooplancton.
- Muestreo de peces con tren de redes de enmalle y trampas (ver Apartado Muestreos Ictiológicos). La ubicación de los artes de pesca en la laguna fue establecida con un navegador satelital GPS (Global Positioning System) Garmin III, permitiéndonos obtener la posición exacta de cada estación (Tabla E. 1)

Tabla E. 1: Posición satelital de las trampas y trenes de enmalle dispuestos en la laguna estudiada.

| Laguna | Juancho | Juancho |
|---------------|-------------|--------------|
| Arte de pesca | Latitud (S) | Longitud (W) |
| Trampa 1 | 36°42.678 | 61°32.572 |
| Trampa 2 | 36°42.481 | 61°33.190 |
| Enmalle 1 | 36°42.535 | 61°32.531 |

MUESTREOS ICTIOLÓGICOS.

A. Descripción de los artes de pesca y Operatoria.

A.1. Trampas para peces

Se utilizaron dos Trampas tipo “garlito” por cada laguna, cuyas características fueron descriptas por Colautti (1998). Cada trampa es un tubo de red de 9 m de largo que se mantiene abierto con una luz interna rectangular gracias a la tensión generada por el anclaje en el sentido del eje mayor del arte y cuatro (4) marcos (1,2 x 0.80 m) dispuestos de manera equidistante. Los peces ingresan por la boca de la trampa que tiene forma cónica, guiados por dos alas laterales de dos metros de largo y una central de 25 m. Las medidas se proporcionan a continuación en la tabla 1.

Tabla 1: Dimensiones y forma de la trampa

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Largo total (eje longitudinal) | 31 m |
| Ancho total (eje transversal) | 4.5m |
| Marcos | 1,2 x 0,80 m |
| Perímetro del tubo | 4m |
| Largo tubo | 9 m |
| Ala central | 25 m |
| Alas laterales | 2 m C/u |

Las trampas fueron colocadas desde la tarde hasta la mañana del siguiente día, en dos estaciones de muestreo cerca de la costa. La posición fue con su eje principal perpendicular a la orilla y su boca orientada hacia la costa.

A.2. Trenes de redes de enmalle

Se utilizaron redes de enmalle dispuestas en un tren de paños de distinto tamaño de malla. El tren de redes utilizado estuvo compuesto por redes de multifilamento de 14 mm- 19 mm- 21 mm - 25 mm - 28 mm - 32 mm - 36 mm - 40 mm y 50 mm bar (de nudo a nudo vecino). Cada una de las citadas tiene longitudes variables entre 4,5 a 70 metros de relinga y una altura de 1,3 m (tabla 2). El tendido fue realizado en forma perpendicular a la dirección del viento en un tren y paralelo al viento en el otro. Los trenes se calaron en estaciones de muestreo, uno en la zona costera y el otro en aguas abiertas.

En ambos casos el tendido de los artes empleados tuvo una duración aproximada de 12 horas, realizándose el calado a las 20 horas y retirándose a las 8 horas del día siguiente.

Tabla 2: Tamaño de las redes de diferente malla que componen cada tren.

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|----|
| Malla mm. | 14 | 19 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
| Largo m | 4.5 | 7.4 | 8.6 | 13.4 | 20.2 | 30.2 | 45.4 | 70.2 | 50 |

B. Procesamiento de las capturas.

Los ejemplares obtenidos con los trenes de redes de enmalle y las trampas fueron clasificados por especie, registrándose el número de individuos y peso total de cada una.

Medición de la Longitud Estándar (medida tomada desde el extremo anterior de la boca del pez hasta la articulación de los radios de la aleta caudal) con precisión de un

centímetro, mediante el uso de un ictiómetro. Ello permitió agrupar a los individuos en intervalos de Longitud Estándar de 10 mm de amplitud.

Con respecto a los ejemplares de Pejerrey provenientes de cada red, los mismos fueron procesados separando una submuestra de cada grupo de talla establecido, constituida por un número máximo de 10 ejemplares mediante su elección al azar.

Los ejemplares integrantes de cada submuestra fueron sometidos a las siguientes mediciones y determinaciones: Longitud Estándar con precisión de 1 mm. Peso con precisión de un gramo. Determinación de sexo y desarrollo gonadal.

C. Calculo de Índices.

C.1. Captura por Unidad de Esfuerzo

Con la finalidad de obtener una primera aproximación a la abundancia relativa de las especies de peces de la laguna con respecto a otros cuerpos de agua estudiados, se procedió a calcular la Captura por Unidad de Esfuerzo de trampas (CPUEt) y por enmalles en cantidad (CPUE_n) y en peso (CPUE_w) para la especie pejerrey, medidas en ind./u.e. y en kg./u.e. con el objeto de obtener la biomasa capturada para dicho cuerpo de agua. Este valor se refiere al número promedio de ejemplares capturados con una determinada unidad de esfuerzo de pesca.

En nuestro caso la Unidad de Esfuerzo fue definida como el promedio de las capturas de cada arte empleado, trampas y de redes de enmalle, para un tiempo de tendido de 12 horas de duración. Las mismas han sido utilizadas en numerosos estudios realizados en otros cuerpos de agua de la Provincia de Buenos Aires, por lo que permiten realizar una comparación entre los valores de CPUE.

C.2. Estructura de tallas e Índice Estructural.

Cuando se analizan las distribuciones de talla de captura realizadas con un tren de redes agalleras es necesario remarcar que cada uno de los paños que lo compone presenta una talla óptima de captura, siendo progresivamente menos eficientes para retener los peces conforme la talla de los mismos se hace mayor o menor que ese óptimo. Esta característica de captura que exhiben las redes agalleras, denominada selectividad, establece que una red en particular sea capaz de capturar un rango de tallas determinado, de acuerdo con su

tamaño de malla. Como consecuencia de lo explicado, la distribución de tallas de captura no representa la distribución real de la población a no ser que los datos se corrijan por la selectividad particular de cada red. En el caso particular de nuestro tren de redes hemos desarrollado las fórmulas necesarias para corregir la selectividad de las redes 19, 21, 25, 28, 32 y 36, pudiendo obtener de este modo una distribución de tallas estimada, cercana a la real de la población.

Con el fin de evaluar la calidad del recurso pesquero pejerrey, se calculó la densidad proporcional de peces de calidad comercial (**PSD**) utilizando los datos de capturas totales del tren sin corregir (Anderson, 1976), según la fórmula:

$$PSD = \frac{n^{\circ} \text{ de peces } \geq 245mm}{n^{\circ} \text{ de peces } \geq 120mm} \times 100$$

Para comparar la condición física de los pejerreyes que habitan las lagunas estudiadas con respecto a los estándares de la especie, se calculó el peso relativo W_r según la fórmula:

$$W_r = \frac{W}{W_s} \times 100$$

Donde W , es el peso observado de los individuos en la laguna estudiada. W_s es el peso estandarizado para un individuo de la misma talla, calculado conforme a la fórmula $W_s = -5,267 + 3,163 \log_{10}$ obtenida a partir de 20155 pares de datos de pejerreyes de diversos cuerpos de agua. Los valores cercanos a 100 indican que los peces se encuentran en óptimas condiciones, alrededor de 85 una condición regular y menores a 75 mala.

RESULTADOS.

I. PLANCTON.

Zooplankton.

Los organismos zooplanctónicos que habitan las lagunas pampeanas constituyen un recurso alimentario de principal importancia para los peces debido a la gran biomasa disponible que representan. En general, las variaciones estacionales del plancton muestran una curva bimodal, con mínimos estival e invernal, y máximos en otoño y primavera. Los rotíferos y los naupliis (larvas de copépodos) conforman la fracción menor del zooplankton, y debido a la abundancia que normalmente representan en los cuerpos de agua resultan de gran importancia en la comunidad planctónica. Su pequeño tamaño los coloca en la base de la pirámide trófica, con alta calidad alimentaria pero solo accesible para organismos acuáticos inferiores o para las primeras fases de desarrollo (etapas larvales) de peces. El zooplankton de mayor tamaño mantiene una densidad natural menor, y se halla compuesto primordialmente por dos grupos: cladóceros y copépodos. Ambos grupos de microcrustáceos forman parte de la dieta básica y predilecta del pejerrey (desde juveniles hasta adultos) entre otros peces.

Los diferentes grupos zooplanctónicos identificados en este ambiente, fueron discriminados por especie y dispuestos en orden taxonómico creciente (tabla Z.1). En dicha tabla se expone la densidad o abundancia total de organismos y de determinada especie por cada litro de agua. El análisis cuali-cuantitativo reveló una comunidad no muy bien estructurada en términos de las abundancias absolutas y de la proporción de organismos pertenecientes a los diferentes grupos. La abundancia total de individuos resultó significativamente menor a los valores promedio obtenidos para las lagunas de la provincia (tabla Z.1). Por el contrario las abundancias absolutas y relativas de algunos de los grupos con mayor importancia, como los copépodos calanoideos resultaron muy elevadas, si tenemos en cuenta que los valores esperables del promedio obtenido entre todas las lagunas pampeanas estudiadas y el promedio para la fecha de muestreo (fig. Z.1). La calidad del zooplankton basada en los requerimientos alimentarios del pejerrey esta dada mayormente por la variedad de especies de gran porte que componen la comunidad planctónica y la estructura de tamaños registrados. En este sentido las densidades tanto de cladóceros como

copépodos ciclopoideos fueron nulas, pero reemplazadas por los calanoideos, cuyas densidades pueden considerarse normal (algo superior a los valores promedio). La representación dominante de sus tallas mayores en contraposición con la ausencia del resto de los grupos planctónicos de importancia le otorgaron a esta laguna un valor de ICT bajo. El ICT arrojó un valor muy por debajo del promedio habitual para la época del año entre los diferentes cuerpos de agua, resaltando que la calidad del recurso alimentario disponible no es buena (fig. Z.2).

Tabla Z.1: Análisis cuali-cuantitativos de los distintos grupos zooplanctónicos hallados en la laguna y comparación con los valores de densidad promedio obtenidos para las lagunas pampeanas.

| | Lagunas pampeanas | Lag. Juancho |
|-----------------|-------------------|---------------|
| | Nº medio | 18/09/2006 |
| Rotíferos tot. | 1218,98 | 95,63 |
| naupliis | 324,83 | 170 |
| Cladoceritos | 5,41 | 0 |
| Cladóceros tot. | 124,24 | 2,43 |
| copepoditos | 37,46 | 19,40 |
| Cope.Harpa tot | 3,04 | 0 |
| Cope.Ciclo tot | 34,84 | 0 |
| Cope.Cala tot | 26,40 | 31,93 |
| Total | 1776,15 | 319,38 |




Figura Z.1: Abundancia relativa de los principales grupos zooplanctónicos en la laguna de Juancho.




Figura Z.2: Representación de los valores individuales de índice de calidad trófica (ICT) (círculos) y valores promedio (puntos negros) obtenidos para diferentes fechas de muestreo en los ambientes estudiados dentro de la provincia de Buenos Aires. Los puntos triangulares representan los valores de la laguna en cuestión.

A 1. Capturas con trampa.

A continuación se presentan las capturas realizadas con las trampas en la laguna Juancho (tabla I.1). Las especies capturadas fueron cinco, siendo el sabalito la especie más representada, seguida por el pejerrey, mojarra y dientudo. Si tenemos en cuenta la biomasa, la especie más representada en promedio fue el sabalito (15,7 kg), seguido por la carpa (0,570 kg), el pejerrey (0,492 kg) y el resto de las especies (figura I.1).

Promediando las capturas de las dos trampas, se capturaron 88,5 individuos con un peso medio de 14,1 kg.

Tabla I.1. Abundancia media de las diferentes especies capturas con las trampas en la laguna Juancho

| | Trampa 1 | | Trampa 2 | | Promedio | |
|---|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Nº ind | peso g. | Nº ind | peso g. | Nº ind | peso g. |
| <i>Cyphocharax voga</i> (Sabalito) | 22 | 4665 | 112 | 26744 | 67 | 15704 |
| <i>Oligosarcus jenynsii</i> (Dientudo) | 0 | 0 | 4 | 138 | 2 | 69 |
| <i>Odontesthes bonariensis</i> (Pejerrey) | 0 | 0 | 13 | 984 | 6,5 | 492 |
| <i>Astyanax</i> sp. (Mojarra) | 0 | 0 | 9 | 66 | 4,5 | 33 |
| <i>Cyprinus carpio</i> (Carpa) | 0 | 0 | 1 | 1141 | 0,5 | 570,5 |
| Total | 22 | 4665 | 139 | 29073 | 80,5 | 16869 |

Capturas con artes de Enmalle.

En la tabla I.2. se presentan los datos de las diferentes especies capturadas con los dos trenes de redes de enmalle en la laguna Juancho. De la misma se desprende que las capturas estuvieron representadas por seis especies, siendo la más representada en las capturas el sabalito (251,26), seguido por el pejerrey (139,85), el dientado (100,57), y el resto de las especies.

Tabla I.2.: Diferentes especies capturadas con un tren de redes agalleras y número de ejemplares capturados de cada una, corregidas a 25 m. y 12 hs. de pesca para la laguna Juancho.

| | R14 | R19 | R21 | R25 | R29 | R32 | R36 | R40 | Total |
|---|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <i>Rhamdia quelen</i> (Bagre sapo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0,83 | 0 | 0 | 2,07 |
| <i>Loricariichthys anus</i> (Vieja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| <i>Cyphocharax voga</i> (Sabalito) | 0 | 6,76 | 11,63 | 27,99 | 25,99 | 72,02 | 25,33 | 81,55 | 251,26 |
| <i>Oligosarcus jenynsii</i> (Dientado) | 5,56 | 57,43 | 34,88 | 1,87 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 100,57 |
| <i>Odontesthes bonariensis</i> (Pejerrey) | 11,11 | 37,16 | 58,14 | 14,93 | 17,33 | 0,83 | 0 | 0,36 | 139,85 |
| <i>Astyanax</i> sp. (Mojarra) | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,11 |
| Total | 27,78 | 101,35 | 104,65 | 44,78 | 44,55 | 74,50 | 25,33 | 82,26 | 505,21 |

En la figura I.1. se puede observar que las capturas del sabalito representaron el 50 %, seguido por el pejerrey (28 %), el dientado (20 %) y el resto de las especies.




Figura I. 1.: Porcentajes totales de las diferentes especies capturadas con el tren de redes de enmalle. Las capturas se transformaron a una longitud de 25 m para todos los paños.

A.2. La población de pejerrey

Las capturas totales de Pejerrey efectuadas en la laguna de Juancho, con los trenes de redes agalleras, distribuidas cada intervalos de talla de 10 mm, se representa en las figura I.2. En estas gráficas se evidencia, que la población está integrada básicamente por un pequeño número de individuos comprendidos entre 125 y 335 mm. En otras palabras el cuerpo de agua posee una pequeña cantidad de pejerreyes, principalmente distribuidos en el rango que entre los 165-245 mm.

Las capturas totales de Pejerrey corregidas por la selectividad (redes 19 a 36), que nos permite conocer la estructura de tallas aproximada de la población, se muestra en la figura I.3.




Figura I. 2.: Distribución de tallas de capturas totales de los dos trenes y transformada a una longitud de 25 m para todos los paños para la laguna Juancho.




Figura I.3. Distribución de tallas estimada para una longitud de 25 m para los paños 19 a 36 y corrección de la distribución por la selectividad de las respectivas redes para la laguna Juancho.

La CPUE (N° ind) arrojó un valor bajo (129,09) al igual que la CPUEw (13,94 kg) (tabla 1.3.). El índice PSD, que expresa la abundancia relativa de pejerreyes de talla con interés deportivo y comercial (> 245mm Lst) arrojó un valor de 5,13 el que indica una reducción de las tallas mayores en la población de pejerreyes de la laguna Juancho, disminuyendo la calidad de esta pesquería.

Tabla I.3. CPUE en n° de ind y kg, y PSD de la laguna Juancho

| Resultados | |
|--------------------|----------|
| CPUE n | 129,09 |
| CPUE w | 13,94 |
| PSD | 5,13 |
| Kg/ha. | 0,43 |
| Kg/lag. | 681,95 |
| pendiente lst-w | 3,17052 |
| interseccion lst-w | -5,23770 |

Peso relativo W_r

Los pejerreyes de la laguna Juancho presentaron una condición entre muy buena y óptima, (fig. I.4.).




Figura I.4.: Peso relativo promedio (W_r) obtenido en función de la longitud estándar (Lst.) de los pejerreyes capturados en la laguna Juancho.

Relación longitud peso

La relación existente entre el peso y el largo de los pejerreyes se ajustó de manera muy estrecha al modelo potencial convencional y los valores observados no mostraron desvíos demasiado grandes con respecto a la curva de ajuste (Fig. I.5.). En la tabla I.4. se detallan los parámetros de la curva que mejor se relacionó con las variables mencionadas para la laguna Juancho.




Figura I.5.: Relación entre la longitud y el peso de los pejerreyes capturados en la laguna Juancho, en círculos valores observados, en línea modelo ajustado.

Tabla I.4: Estadísticos de la relación longitud peso para la laguna estudiada.

| Regresión Lst-W | |
|-----------------|-------|
| pendiente | 3,17 |
| intersección | -5,24 |
| r ² | 0,97 |
| Lst max | 332 |
| Lst min | 125 |

CONCLUSIONES

1. La calidad del zooplancton presente en la laguna resultó empobrecida observándose que la disponibilidad alimentaria, medida en términos de abundancia del zooplancton de calidad, es escasa, encontrándose muy por debajo de los valores promedio entre todos los ambientes estudiados para la época del año en que se tomó la muestra. Por lo tanto la disponibilidad actual del recurso no es buena, sostenida casi exclusivamente por las formas adultas de copépodos calanoideos.
2. Sobre la base de estos resultados se puede concluir que el sabalito es la especie dominante en la laguna estudiada.
3. La población de pejerrey no está muy bien estructurada, teniendo en cuenta el rango de tamaños capturados. Esta población está caracterizada por la existencia de un grupo peces de menor tamaño que son claramente predominantes y una baja cantidad de ejemplares de tallas mayores correspondientes a otras generaciones.
4. Las capturas por unidad de esfuerzo (CPUEn) asumió un valor bajo (129,09), siendo muy inferior al registrado en el año 1997 (569,5) y la CPUEw se comportó de igual manera. En comparación con otros cuerpos de agua de la Provincia, los valores de estos índices indican la existencia de una empobrecida población de pejerrey. Por su parte, el PSD fue muy bajo de tan solo el 5% de la población muestreada.
5. Los pesos relativos (W_r) estimados para la laguna indican que los individuos de la población de pejerreyes en general presentan un estado físico entre muy bueno y óptimo.

Dirección Desarrollo Pesquero; SSAP, MAA.



6. Todos estos atributos establecen para la laguna Juancho un rendimiento potencial pesquero de aproximadamente 0,43 kg/ha/año de pejerrey extraíble (longitud >245mm), y una estimación de 681,95 kilogramos para toda la laguna.

DIRECCION DE DESARROLLO PESQUERO